

Бровадазол порошок
(порошок для перорального застосування)
листівка–вкладка

Опис

Порошок від білого до сірувато-білого кольору зі слабким специфічним запахом.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

фенбендазол - 50,0 мг.

Допоміжні речовини: мальтодекстрин.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (ATCvet QP52AC13, фенбендазол)

Механізм дії фенбендазолу пов'язаний з порушенням енергетичного обміну, руйнуванням мікроканальців травних клітин та появою нейротоксичного ефекту у гельмінтів. Фенбендазол також згубно діє на личинки різних стадій та порушує цілісність оболонок яєць гельмінтів. Останні, при потраплянні у навколишнє середовище, не спроможні до подальшого розвитку.

Застосування

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, м'ясоїдних, хутрових звірів, курей, гусей при ураженні нематодами (зрілими і незрілими формами), деякими видами цестод і трематод.

Дозування

Дози і кратність застосування препарату для дегельмінтизації різних видів тварин:

Вид тварини і назва гельмінтозу	Разова доза (мг/кг маси тіла)		Кратність застосування
	Бровадазол порошок	Фенбендазол	
Велика рогата худоба:			
диктіокаульоз, стронгілятози травного каналу, стронгілоїдоз	200	10	одноразово
дикроцеліоз	660	33	одноразово
Дрібна рогата худоба:			
диктіокаульоз	200	10	одноразово
монієзіїози	200	10	одноразово
трихуроз	300	15	2 доби поспіль
ехінококоз, ценуроз	800	40	3 доби поспіль
дикроцеліоз	440	22	2 доби поспіль
Свині:			
аскароз	150	7,5	2 доби поспіль
трихуроз	200	10	2 рази на добу
езофагостомоз і стронгілоїдоз	200	10	одноразово
поросята з 2-х до 8-ми тижневого віку:			
аскароз	20	1	один раз на тиждень
трихуроз	20	1	
маточне поголів'я (аскароз, трихуроз, езофагостомоз, стронгілоїдоз)	150	7,5	2 рази на добу
Коні:			
Параскаридоз, стронгілідози, ціатостомідози травного тракту, оксіуроз	300	15	одноразово

03.03.2020

стронгілоїдоз (лошата 1-2 міс. віку)	160	8	2 доби поспіль
М'ясоїдні та хутрові звірі:			
нематодози, цестодози	300	16	разово
Кури: на птицю			
аскаридіоз	100	5	2 доби поспіль
аскаридіоз, гетеракоз	200	10	одноразово
Гуси: на птицю			
нематодози, цестодози	800	40	одноразово

Препарат згодують індивідуально або груповим методом. При груповій дегельмінтизації загальна кількість препарату збільшується на 5 %. Суміш корму з препаратом Бровадазол порошок згодують на початку ранкової годівлі.

Перед масовою дегельмінтизацією кожен серію препарату попередньо випробовують на невеликій кількості тварин, за якими спостерігають протягом доби. Дегельмінтизація дозволяється за відсутності ускладнень у цих тварин.

Протипоказання

Бровадазол порошок не можна застосовувати тваринам одночасно з протифасціольозними препаратами, а також впродовж 7 діб після лікування тварин бромсаланами.

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяють після останнього застосування препарату:

- велика рогата худоба, вівці, кози, свині - через 10 діб;
- птиця - через 3 доби.

Використання внутрішніх органів тварин (печінки, легень, серця) в їжу дозволяється через 20 діб.

Споживання молока людям дозволяють через 2 доби після останнього застосування препарату.

Форма випуску

Контейнери або пакети із полімерних матеріалів по 10, 100, 1000 г.

Зберігання

Сухе темне місце при температурі до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна