

**ФІТОСЕПТ мазь для доїння
(мазь)**

листівка-вкладка

Опис

Мазь сметано-подібної консистенції жовтого кольору зі специфічним запахом.

Склад

100 г препарату містить діючу речовину:

настоянка календули - 20 мл.

Допоміжні речовини: олія обліпихи, олія оливкова, ланолін, вазелін, емульгатор Т-2, орісіл, твін-80, арквад 50, ароматизатор, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код: QG52 – ветеринарні препарати для лікування дійок та вим'я (QG52C – ветеринарні препарати з пом'якшувальною і захисною дією (емоменти)).

Настоянка календули в складі мазі чинить протизапальну, репаративну та антисептичну дію. Ці ефекти зумовлені багатим вмістом речовин (каротиноїди, флавоноїди, сапоніни, дубильні речовини, тритерпенові глікозиди, органічні кислоти, аскорбінова кислота), які збільшують ріст грануляцій, поліпшують епітелізацію, посилюють місцеві захисні механізми.

Комбінація допоміжних речовин забезпечує необхідні технологічні властивості препарату та потенціює фармакологічну дію настоянки календули.

Олія обліпихи та олія оливкова виявляють виражені емоментні, трофічні та репаративні властивості, сприяють відновленню ліпідного шару шкіри, підвищують її еластичність і зменшують прояви сухості та тріщин.

Ланолін і вазелін утворюють на поверхні шкіри захисну гідрофобну плівку, яка запобігає трансепідермальній втраті вологи, забезпечує тривалу дію активних компонентів і захищає шкіру від дії зовнішніх подразників.

Препарат має асептичну і протизапальну дію. При зовнішньому застосуванні посилює місцевий кровообіг, активізує живлення шкіри, що сприяє загоєнню мікротравм, захищає шкіру від обвітрювання, впливу сонця і морозу, знижує подразнювальну дію внаслідок укусів комах.

Застосування

Фітосепт мазь для доїння застосовують зовнішньо місцево коровам, кобилам із профілактичного метою для попередження запальних процесів шкіри молочної залози, особливо при недотриманні санітарно-гігієнічних вимог, порушенні правил машинного доїння; для лікування і профілактики за мікротравм, тріщин та ерозії дійок, застосовують для обробки рук акушера або рукавиць акушера при наданні рододопомоги та акушерсько-гінекологічних маніпуляціях.

Дозування

Після доїння і санітарної обробки вимені препарат у невеликій кількості втирають у дійки і вим'я (до 1 см при видавлюванні із туби). На уражені ділянки шкіри мазь наносять у невеликій кількості і злегка втирають 1–2 рази на добу до одужання. На рану мазь вносять за допомогою дренажів, тампонів або марлевих пов'язок, які змінюють через 1–2 доби до повного загоєння.

02.12.2025

Протипоказання

Не встановлені.

Застереження

Побічна дія

Відсутня.

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Обмежень немає.

Особливі застереження при використанні

Немає.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідома.

Період виведення (каренції)

Не вимагається.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Форма випуску

Туби з полімерних матеріалів по 100 г.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 2 до 20 °С.

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА",

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА",

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна