

31.10.2025

Фунгіцидно-акарицидна мазь «Ям»

(мазь)

листівка-вкладка

Опис

Мазь від світло-сірого до темно-сірого з коричневим відтінком кольору зі специфічним запахом.

Склад

100 г препарату містять діючі речовини:

дьоготь березовий – 10 г;

скипидар живичний – 7 г;

сульфур – 10 г;

кислоту саліцилову – 2 г;

цинку оксид – 10 г;

лізол – 6 г.

Допоміжні речовини: ланолін, вазелін.

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код: QD - дерматологічні ветеринарні препарати (QD10AX30 - різні комбінації препаратів).

Препарат має виражені фунгіцидні, бактерицидні та протипаразитарні властивості, зумовлені синергічною дією речовин, що входять до складу препарату.

Дьоготь березовий діє антисептично та протипаразитарно, проявляє місцеву подразнюючу, в'язучу та підсушуючу дії.

Протипаразитарна та протимікробна дія сірки зумовлена здатністю за наявності вологи, лугів і органічних речовин утворювати сірчистий ангідрид, сірководень, кисень і сірчисті луги, які діють кератопластично та кератолітично.

Кислота саліцилова при місцевому застосуванні подразнює шкіру та сприяє відторгненню ороговілих клітин епітелію. На поверхні рани посилює грануляцію, діє бактерицидно, антиоксидно, фунгіцидно.

Цинку оксид проявляє в'язучу, підсушуючу та дезінфікуючу дії.

Лізол проявляє протизапальну, бактерицидну та інсектицидну дії.

Вазелін та ланолін у препараті виконують функцію маzewої основи.

Застосування

Лікування спортивних коней, собак, котів, декоративних кролів за трихофітії, екземах, дерматитах та інших захворюваннях шкіри; ураженнях копит при некробактеріозі, саркоптозі (корості).

Дозування

Перед застосуванням мазь перемішують, оскільки при тривалому зберіганні можливе розшарування компонентів, що входять до її складу. Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри і на 2-4 см навколо них, без попереднього видалення лусочок і вистригання шерсті; при цьому її злегка втирають у шкіру. Уражені ділянки обробляють 1-2 рази на добу до відокремлення лусочок. Якщо через 4-5 днів лусочки не відокремилися, втирання мазі продовжують. Як правило, через 7-10 днів уражені ділянки звільняються від лусочок і на них спостерігається ріст волосся.

Після завершення обробки проводять контрольні мікроскопічні дослідження зіскобів. При виявленні збудника хвороби лікування продовжують.

Протипоказання

Немає.

31.10.2025

Застереження

Немає.

Форма випуску

Туби з полімерних матеріалів по 20, 50, 90 г; контейнери з полімерних матеріалів по 20, 50, 90, 250 г.

Зберігання

Суше темне, недоступне для дітей місце при температурі від 0 до 25 °С.

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна