

11.08.2025

Мазь іхтіолова 10%
(мазь)
листівка-вкладка

Опис

Мазь сметано-подібної консистенції темно-бурого кольору зі специфічним запахом.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

бітуміносальфонати – 100,0 мг.

Допоміжна речовина: вазелін (мазева основа).

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код: QD08AX – Інші антисептики та дезінфектанти.

Діюча речовина мазі бітуміносальфонати (іхтіол) володіє протизапальною, місцевознеболювальною, кератопластичною та слабкою антимікробною (бактерицидною та бактериостатичною) діями. Іхтіол при безпосередній дії на шкіру та слизові оболонки спричиняє слабе подразнення чутливих нервових закінчень, тим самим понижуючи їх чутливість, що призводить до виникнення рефлексів, які змінюють живлення тканин. При нанесенні на рани звужує периферичні кровоносні судини, зменшує ексудацію та прискорює регенеративні процеси, регулює судинний тонус, відновлює кровообіг, покращує обмін речовин.

При зовнішньому застосуванні мазь практично не абсорбується в системний кровотік і не проявляє резорбтивної дії.

Застосування

Лікування великої рогатої худоби, коней, овець, кіз, свиней, собак, котів за дерматитів, фурункульозу, екзем, флегмон, артритів, тендовагінітів, обморожень, термічних та хімічних опіків.

Дозування

Мазь застосовують зовнішньо, наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри 1-2 рази на добу, відкритим або закритим (під пов'язкою) способом. Тривалість курсу лікування обумовлена характером захворювання.

Протипоказання

Не встановлені.

Застереження

Побічна дія

У тварин, чутливих до компонентів препарату, можливі місцеві або генералізовані прояви алергічних реакцій, включаючи шкірні висипання, свербіж, печіння, почервоніння шкіри, частіше на початку лікування або при тривалому застосуванні. При виникненні таких ускладнень застосування препарату припиняють і призначають десенсибілізуючу терапію.

Особливі застереження при використанні

Уникати потрапляння мазі на слизові оболонки. Руки після нанесення мазі слід ретельно вимити для запобігання потраплянню залишків мазі в очі, ніс, рот.

Використання під час вагітності та лактації

Обмежень немає. При застосуванні в ділянці вим'я молоко може мати запах іхтіолу.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з алкалоїдами, йодовмісними препаратами, солями важких металів!

Період виведення (каренції)

М'ясо – 0 діб, молоко – 0 годин.

11.08.2025

Форма випуску

Туби з полімерних матеріалів по 20, 50, 90 г; контейнери з полімерних матеріалів по 20, 250, 1000 г.

Зберігання

Сухе, захищене від світла, недоступне для дітей місце при температурі від 2 до 25 °С.

Термін придатності

5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари
Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари
Київська обл., 07400, Україна