Додаток 2
до реєстраційного посвідчення АВ-09945-01-26

02.02.2026

Іруксовет
(мазь)
листівка-вкладка

Опис

Мазь від білого до світло-жовтого кольору, однорідна, зі специфічним запахом.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини:
хлорамфенікол – 10 мг;
колагеназу – 0,4 мг.
Допоміжні речовини: сорбітану сесквіолеат, ланолін, вазелін.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код: QD03 – Препарати для лікування ран та виразок. QD03AX – Інші препарати для лікування ран та виразок.

Комбінований препарат із протеолітичною та протимікробною дією.

Хлорамфенікол (*Chloramphenicolum*) – антибіотик широкого спектра дії, активний проти грампозитивних (*Staphylococcus spp.*, *Enterococcus spp.*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium spp.*, *Listeria monocytogenes*) та грамнегативних (*Neisseria meningitidis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Haemophilus influenzae*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Yersinia pestis*, *Vibrio cholerae*, *Bacteroides fragilis*) бактерій. Хлорамфенікол чинить бактеріостатичну дію шляхом пригнічення синтезу білка в мікроорганізмах, зв'язуючись з 50S-субодиницею бактеріальної рибосоми та блокуючи пептидилтрансферазний центр, що зупиняє формування пептидних зв'язків, елонгацію поліпептидного ланцюга та призводить до припинення росту бактерій.

Колагеназа (клостридіопептидаза А) – протеолітичний фермент, що продукується *Clostridium histolyticum*. Спричиняє лізис некротичних тканин і колагенових волокон та сприяє ферментативному очищенню ран. Стимулює процеси грануляції і не пригнічує епітелізацію. Фермент не впливає на здорові тканини – неушкоджений епітелій, грануляційну, жирову та м'язову тканини, і оптимально діє при pH 6–8. Безводна ліпофільна основа мазі захищає фермент від денатурації та втрати активності під час зберігання. Активація ферменту відбувається при контакті з вологою рани чи зволоженою пов'язкою.

Очищувальна дія мазі починається з першого використання. Фармакокінетичний профіль препарату визначається локальною дією колагенази, яка через високу молекулярну масу не всмоктується у кровотік, та потенційно системною дією хлорамфеніколу. Завдяки ліпофільності хлорамфенікол може проникати через пошкоджений шкірний бар'єр, причому ступінь його абсорбції залежить від стану рани. Особливу увагу слід приділяти міжвидовим відмінностям у метаболізмі: через дефіцит глюкуронідної кон'югації у котів кліренс хлорамфеніколу значно уповільнений, що створює ризик кумуляції та токсичних ефектів порівняно з собаками.

Застосування

Для ферментативного очищення ран та попередження інфікування вторинною мікрофлорою, чутливою до хлорамфеніколу, лікування виразок та некрозів (пролежні, опіки II та III ступеня), відморожень, гнійно-некротичних уражень шкіри у собак та котів. Мазь можна застосовувати у післяопераційний період.

Дозування

Перед використанням рану, або уражену ділянку шкіри, промивають та очищують. Мазь наносять на злегка зволожену уражену ділянку шаром 2 мм 1–2 рази на добу протягом 5 – 10 діб. Некротизовані тканини видаляють під час зміни пов'язки.

02.02.2026

Протипоказання

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до діючих речовин препарату, за захворювань крові (панмієлопатія, гемолітична жовтяниця) в анамнезі.

Застереження

Побічна дія

На початку лікування можливі місцеві реакції (печіння та біль у ділянці рани). Іноді спостерігаються алергічні прояви – контактний дерматит, шкірні висипи.

Особливі застереження при використанні

Слід враховувати можливість системної абсорбції хлорамфеніколу та ризик розвитку гематологічних порушень у котів. Для запобігання злизуванню необхідно використовувати захисний комір або накладати фіксуючу пов'язку на весь час лікування до повного всмоктування або видалення залишків мазі.

Перед застосування рекомендується провести тест на чутливість бактерій, виділених від хворих тварин, до хломарфеніколу. Якщо це неможливо, лікування має базуватися на місцевій епізоотичній інформації про чутливість відповідних бактерій.

Використання під час вагітності та лактації

Безпека застосування під час вагітності та лактації не встановлена. Використовувати лише після оцінки співвідношення ризик/користь лікарем ветеринарної медицини і під його контролем.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з іншими місцевими засобами, оскільки це може знизити ефективність препарату. Уникати використання антисептиків, що містять йод, срібло, солі важких металів, а також перекисів і детергентів, які інактивують колагеназу. Якщо такі засоби застосовувалися раніше, перед нанесенням мазі рану необхідно ретельно промити фізіологічним розчином.

Передозування

Випадки передозування при місцевому застосуванні малоймовірні. За випадкового проковтування проводять симптоматичне лікування.

Період виведення (каренції)

Препарат продуктивним тваринам не застосовують.

Форма випуску

Туби з полімерних матеріалів по 20 г.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури до 25 °С. Не заморожувати.

Термін придатності

2 роки.

Після відкриття туби препарат використати протягом 28 діб.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення і виробник готового продукту:

ТОВ «БРОВАФАРМА»

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна.