

11.07.2025

Комбійод
(розчин для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Розчин червоно-коричневого кольору зі слабким запахом йоду.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини (мг):

повідон-йод – 200,0;

натрію селеніт – 1,2.

Допоміжні речовини: полівінілпіролідон, пропіленгліколь, кислота лимонна, натрію фосфат двоосновний, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код: QA07 – Антидіарейні ветеринарні препарати, які застосовують для лікування інфекційних запальних захворювань кишечника. QA07XA99 – Інші антидіарейні препарати, комбінації.

Повідон-йод (полівінілпіролідону йодид) — це комплекс йоду з полівінілпіролідонем (ПВП), який характеризується бактерицидною (у відношенні до грампозитивних та грамнегативних бактерій), віруліцидною, фунгіцидною, спорицидною, антипротозойною діями.

При контакті зі слизовими оболонками та ураженими тканинами з йод-полімерного комплексу виділяється активний йод, який реагує з окиснювальними сульфідними (SH–) та гідроксильними (ОН–) групами амінокислот, які входять до складу ферментів і структурних білків мікроорганізмів, інактивуючи чи руйнуючи їх.

При комплексоутворенні з ПВП йод втрачає місцевопоздразнювальну дію, яка притаманна спиртовим розчинам йоду. Завдяки великому розміру комплексної молекули повідон-йоду, він практично не проникає через біологічні бар'єри і системна дія йоду практично не проявляється, а в комплексі з допоміжними речовинами забезпечує антисептичну та протизапальну дію.

Резистентність до повідон-йоду у мікроорганізмів не виникає.

Довготривале застосування препарату може призвести до часткового всмоктування йоду у тонкому кишечнику. Впродовж 2 годин після всмоктування він розподіляється у міжклітинному просторі, накопичується у щитоподібній залозі, нирках, шлунку, молочних та слинних залозах. Концентрація у плазмі крові може сягати 10 нг/мл. Йод виводиться в основному із сечею, меншою мірою — легенями та з фекаліями.

Йод є одним з основних складових компонентів тироксину і трийодтироніну — гормонів щитоподібної залози, які регулюють майже всі основні види обміну речовин. Так, тироксин відповідає за енергетичний обмін і рівень теплопродукції в організмі, є каталізатором утворення енергії в клітинах.

Селен відіграє значну роль в утворенні понад 30 необхідних організму гормонів, ферментів та інших біологічно-активних речовин, стимулює еритроцитопоез, покращує живлення клітин киснем.

Застосування

Препарат застосовують для лікування і профілактики свійської птиці (курчата-бройлери, кури, індики) та бджіл при захворюваннях, спричинених бактеріями, вірусами, міксоміцетами, найпростішими чутливими до йоду та за порушень обміну речовин.

Дозування

Свійська птиця (курчата-бройлери, кури та індики) — перорально з питною водою у дозі 200 мл препарату на 1000 л питної води впродовж 5-7 діб, в складних випадках — до 10 діб, або двома п'ятидобовими курсами з тижневим інтервалом.

Дози препарату розраховані для питної води із рН не менше 6-7 одиниць. За більш жорсткої води дозу препарату слід збільшити на 5-10%.

Під час курсу лікування птиця повинна отримувати лише питну воду з препаратом. Свіжий розчин препарату необхідно готувати щоденно.

11.07.2025

Можливе застосування препарату для санації водопровідної системи — 0,2% розчин Комбійоду за експозиції 2 години. При наповненні водопроводів цим розчином препарату відбувається санація та знешкодження бактеріальних біоплівок.

Бджоли — з метою підвищення резистентності, продовження життя бджіл весняної генерації. лікування бджіл за ентеробактеріозів та ноземозів препарат застосовують перорально з водою або розчином цукру чи медовою ситтю по 330-400 мл 0,075-0,1% розчину Комбійоду (еквівалентно 7,5-10 мл препарату на 10 л суміші). Такий розчин фасують у тонкі целофанові пакети і поміщають на центр розплідного гнізда або заливають у годівниці чи стільники крайніх рамок. Згодовувати необхідно 4 рази з інтервалом 5-7 діб. За ентеробактеріозів та ноземозу бджіл, з лікувальною метою таку ж концентрацію та кількість даного препарату згодовують 4-6 разів з інтервалом 5-7 діб до одужання сімей.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам, чутливим до йоду.

Застереження

Не застосовувати препарат за дві доби до та впродовж двох діб після вакцинації птиці.

Забій птиці на м'ясо та використання яєць і меду для споживання людьми без обмежень.

Форма випуску

Флакони з крапельницями з полімерних матеріалів по 10 мл; флакони з полімерних матеріалів по 50,0; 100,0; 250,0 1000 мл; каністри з полімерних матеріалів по 2,0; 5,0 та 20,0 л.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце, за температури від 4 до 30 °С.

Термін придатності — 2 роки.

Термін придатності після першого відкриття (відбору) — 30 діб за умови зберігання в герметично закритій тарі виробника.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту:

ТОВ "БРОВАФАРМА", Україна

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400