

**УСУВАЄ
СВЕРБІННЯ,
ПОВЕРТАЄ
ЯСКРАВИТЬ
ЖИТТЯ**



РП № АВ-09380-01-20



Ветдерм

СУСПЕНЗІЯ



**ШИРОКИЙ СПЕКТР
ДІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ
ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ
ТА СВЕРБЕЖУ**

- Bloшиний дерматит
- Алергічний аліментарний дерматит
- Свербіж невідомого походження
- Бактеріальні ураження шкіри
- Екземи



1 мл містить:

тріамцінолон – 1 мг
метіонін – 50 мг
бурштинова кислота – 2 мг

вітамін B₂ – 5 мг
вітамін B₃ – 10 мг
вітамін B₆ – 3 мг

Здоров'я тварин – турбота про людей



ТОВ «БРОВАФАРМА»
б-р Незалежності, 18 А, м. Бровари
Київська обл., Україна, 07400

brovapharma
тел.: +38 044 599 32 24
www.brovapharma.ua

ДИВІТЬСЯ
НА САЙТІ



СКАНУЙ

Ветдерм

Склад

1 мл містить:
тріамцінолон — 1 мг
метіонін — 50 мг
бурштинова кислота — 2 мг
вітамін В₂ (рибофлавін) — 5 мг
вітамін В₃ (РР, нікотинамід) — 10 мг
вітамін В₆ (піридоксин) — 3 мг

Опис

Суспензія світло- або темно-жовтого кольору.



СУСПЕНЗІЯ

ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ

Фармакологічні властивості

Триамцінолон — синтетичний фторвмісний глюкокортикоїд з вираженою протизапальною, протиалергічною, десенсибілізуючою та антитоксичною дією. Метіонін знешкоджує токсичні продукти обміну речовин шляхом метилювання і транссульфурування. Бурштинова кислота прискорює процеси регенерації пошкоджених клітин шкіри, стимулює і нормалізує енергетичний та пластичний обміни, має антитоксичну дію, підсилює біохімічні і фізіологічні відновні процеси в епідермісі та усуває метаболічний ацидоз у тканинах. Вітаміни групи В значно покращують стан шкірних покривів, особливо при себореїному дерматиті і пелагрі.

Показання

Лікування собак і котів за запальних, алергічних, аутоімунних та інших захворювань шкіри і суглобів.

Протипоказання

Не призначати тваринам, чутливим до діючих речовин препарату, за системних грибкових уражень, гострих інфекційних захворювань, діабету, вагітним і лактуючим тваринам, кошенятам віком до 2 місяців, цуценятам віком до 3 місяців.

Не застосовувати в періоди щеплення, особливо живими протівірусними вакцинами та одночасно з іншими кортикостероїдними препаратами.

Спосіб застосування та дози

Перед використанням флакон із препаратом ретельно струшують і застосовують перорально один раз на добу, під час ранішньої годівлі з невеликою кількістю корму або вводять безпосередньо на корінь язика за допомогою шприца-дозатора. Дози препарату для лікування тварин у перші 4 доби наведені у таблиці.

Вид тварин	Маса тіла (кг)	Добова доза (на тварину, мл)
Собаки	<10	0,5
	10-20	1
	20-30	1,5
	30-40 і більше	2
Коти	1-3	0,25
	3 і більше	0,5

Застереження

Побічних явищ та ускладнень не спостерігається.

Упаковка

Флакони по 10, 15 мл.

Умови зберігання

У сухому темному, недоступному для дітей місці, за температури від +4 до +25 °С. Після відкриття флакона препарат використати протягом 28 діб.

Термін придатності

2 роки.



ПРЕПАРАТ ВИКОРИСТОВУВАТИ
ЛИШЕ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ЛІКАРЯ

Безкоштовна
консультація:

+38 050 315 73 08

 **бровасфарма®**

Здоров'я тварин — турбота про людей

